

Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL : 140 F - Régisseur Recettes D.R.A.F. - CCP DIJON 35 00 28 0



☎ 80.22.19.38

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 24 - 16 septembre 1987

COLZA

Altises : *Pas de capture*

Levées en cours : *Surveiller les morsures*

Limaces : *A surveiller*

C O L Z A

- Les semis sont terminés.
- Dans un certain nombre de situations les levées n'ont pas encore commencé ; il s'agit de parcelles semées après le 30/08, dans des sols à tendance argileuse, et ayant reçu peu de pluies depuis cette date.
- Dans la majorité des cas, les parcelles sont au stade "cotyédélons étalés - 1ère feuille".
- Dans d'autres situations, qui correspondent le plus souvent à des semis antérieurs au 30/08, le stade 2 feuilles vraies est atteint voire dépassé.

GROSSES ALTISES

- Pas de capture.
- Dans les parcelles n'ayant pas encore atteint le stade 2 feuilles vraies ; surveiller et intervenir si un pied sur deux ou trois présente des morsures.
- Dans les parcelles ayant dépassé le stade 2 feuilles vraies : ne pas envisager de traitement dans l'immédiat.

LIMACES

- A surveiller attentivement.
- En présence de ces ravageurs, épandre régulièrement des granulés à base de *mercaptodiméthur* (Mesurol anti limaces 3 kg/ha) ou de *métaldéhyde* (nombreuses spécialités 15-30 kg/ha).

DESHERBAGE DE RATTRAPAGE : destruction des repousses de céréales

SITUATION :

Compte tenu des conditions de préparation des terres au cours des mois d'août et de septembre, ce problème ne devrait pas être très important cet automne.

P.38

PRECONISATION :

La modulation de la dose d'herbicide à apporter est fonction :

- du type de repousses : les repousses de blé nécessitent la dose forte,
- de leur développement végétatif,
- de la qualité de la pulvérisation : une faible dose d'herbicide exige un très bon réglage du pulvérisateur

SITUATION	PRECONISATIONS
- INFESTATION MASSIVE, PRECOCE (dès la levée du colza) QUI CONCURRENCE LA CULTURE	<ul style="list-style-type: none"> - intervention herbicide rapide - utilisez un produit à action foliaire : <ul style="list-style-type: none"> . Fervin : 0,75 à 1 Kg + 2-3 l huile Schéring . Fervinal : 1,5 l à 2,0 l. + 2-3 l. huile Schéring . Fusilade X 2 : 0,5 l. + Agral (0,1 % du volume de bouillie) . Gallant : 0,75 à 1,0 l. . Targa : 0,75 à 1,25 l. + 2 l. huile Schéring - Respecter les conditions d'emploi de Fervin et Fervinal
- LEVEES ECHELONNEES	<ul style="list-style-type: none"> - attendez qu'un maximum de repousses soient présentes - utilisez un produit à action foliaire : voir précédemment, mais tenez compte du développement végétatif des repousses pour définir la dose d'emploi - En application tardive, il est possible d'utiliser des produits à action racinaire : <ul style="list-style-type: none"> . Kerb 50 : 0,75 à 1,0 Kg à partir du stade 3 feuilles vraies du colza . Légurame PM : 2-3 Kg à partir du stade 4 feuilles vraies du colza

Remarque : Pour les spécialités à action foliaire, avec les températures élevées que nous connaissons actuellement, éviter les traitements aux heures chaudes de la journée.

*

*

*